

經歷影響額葉的創傷性腦損傷的患者，可能會出現以下各種變化：

- 在理解圖案和物體的順序方面存在困難
- 重複思考同一個想法，在某一行為或某個單詞上卡住，即便話題已經結束
- 難以集中精力完成任務
- 性格改變
- 在解決問題方面有困難
- 在用言語表達想法方面有困難
- 自發性喪失
- 難以從一種想法轉換成另一種想法
- 無法控制情緒、社會行為和性行為的變化
- 無法自主地控制手腳動作

經歷影響頂葉的創傷性腦損傷的患者，可能會出現以下各種變化：

- 難以掌握學習技能
- 難以說出對象名稱
- 混淆左右手
- 難以處理接觸到的物品
- 難以跟住物體或難以集中注意力於所看見的事物
- 手眼協調困難
- 缺乏對身體部位的感知
- 空間定位能力下降

經歷影響顳葉的創傷性腦損傷的患者，可能會出現以下各種變化：

- 難以理解別人說的話
- 難以集中注意力於多個活動中的一個
- 記不住剛剛發生的事
- 性傾向變化
- 喋喋不休
- 攻擊性行為增多
- 難以識別和歸類物品
- 難以認出別人的樣貌，難以用肉眼找到對象

經歷影響枕葉的創傷性腦損傷的患者，可能會出現以下各種變化：

- 直視前方時無法看到兩旁的東西
- 難以用肉眼找到對象
- 難以辨別顏色
- 出現幻覺
- 視覺扭曲
- 不識字
- 無法識別移動的對象
- 閱讀困難
- 書寫困難
- 在視覺資訊處理方面存在困難

經歷影響小腦的創傷性腦損傷的患者，可能會出現以下各種變化：

- 大小動作調節能力受損
- 行走能力喪失
- 姿勢控制能力差
- 無法快速運動
- 眼球轉動控制力受損
- 震顫
- 頭暈
- 口齒不清

經歷影響顳葉的創傷性腦損傷的患者，可能會出現以下各種變化：

- 難以理解別人說的話
- 難以集中注意力於多個活動中的一個
- 記不住剛剛發生的事
- 性傾向變化
- 喋喋不休
- 攻擊性行為增多
- 難以識別和歸類物品
- 難以認出別人的樣貌，難以肉眼找到對象